

## CAMPYLOBACTER

FECHA DE EXPOSICIÓN: \_\_\_\_\_

### AVISO PARA LOS PADRES

Su hijo puede haber estado expuesto al campylobacter. Una descripción de esta enfermedad sigue a continuación. Si su hijo(a) desarrolla cualquiera de estas señales o síntomas escritos abajo, por favor consulte al médico de su hijo(a) y notifique a la escuela.

La política de la escuela excluye de la asistencia a los niños(as) con campylobacter mientras la diarrea sea severa o hasta las 24 horas de tratamiento con medicamentos. El tratamiento con antibióticos acorta el periodo de contagio y ayuda a prevenir la propagación de la infección, pero puede no tener mucho efecto en la diarrea. Las personas que cuidan a los niños infectados deben practicar BUENAS TÉCNICAS DE LAVADO DE MANOS (jabón y agua caliente).

**AGENTE CAUSANTE:** Una bacteria, Campylobacter jejuni; diagnosticada por un cultivo de heces.

**SEÑALES Y SÍNTOMAS:** El campylobacter causa una forma de gastroenteritis o “gripe estomacal”. Los síntomas usualmente incluyen diarrea y fiebre. Vómitos pueden estar presentes. A menudo, la diarrea contiene mocos en la sangre, y el dolor abdominal parece especialmente severo. La enfermedad usualmente desaparece por sí misma en menos de una semana.

**PERIODO DE INCUBACIÓN:** Dos a 11 días—usualmente menos de una semana.

**PERIODO DE COMUNICABILIDAD:** Hasta que la diarrea haya terminado o los antibióticos han comenzado.

**MÉTODO DE TRANSMISIÓN:** El campylobacter se excreta en las heces y se propaga vía manos y objetos contaminados. Los lagos y arroyos pueden contaminarse con campylobacter y actuar como una fuente de infección. La leche cruda y la carne de ave no cocinada pueden contener campylobacter.