

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS

CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

Marinhhs.org





CAMPYLOBACTER

Su hijo(a) pudo haber estado expuesto(a) a esta enferme	dad el
	Fecha(s)
Por favor revise si su hijo(a) presenta síntomas hasta el	•
	Fecha
Si presenta síntomas, comuníquese con el proveedor de cuidado	o de la salud de su hijo(a).

Si mi hijo tiene esta enfermedad, ¿cuándo puede regresar a la escuela o la guardería? Los niños de 5 años de edad o menores, O un niño mayor de esa edad pero que comparte salón de clases con niños menores de 5 años, pueden regresar a la escuela o guardería cuando ya no presenten diarrea. No hay restricciones para los niños mayores de 6 años de edad.

La campylobacter es una bacteria que provoca la enfermedad llamada campilobacteriosis. Los síntomas son:

- Diarrea, que con frecuencia presenta sangre
- Dolor de estómago y cólicos
- Náuseas y vómito

Los síntomas generalmente comienzan entre 1 y 5 días después de que la persona estuvo expuesta a la bacteria, pero pueden tardar hasta 10 días.

¿Cómo se propaga la campylobacter?

- Comer carne de ave que no esté bien cocida
- Comer alimentos que han estado en contacto con carne de ave y no se limpiaron
- Beber leche bronca o no pasteurizada
- Tocar las heces de una persona enferma
- Tragar agua de lagos, arroyos, o chorros de agua que contengan esta bacteria

Una persona enferma puede propagar la bacteria en sus heces en cualquier momento mientras tenga los síntomas, y hasta 7 semanas después de haber contraído la enfermedad. Es raro que una persona propague la bacteria a otra persona, pero puede

¿Qué puedo hacer ahora?

Busque los síntomas de la campilobacteriosis en su hijo(a). Llame al médico de su hijo(a) si él/ella se enferma. La mayoría de las personas se recupera sin antibióticos en un plazo de entre 2 y 10 días. Una persona que esté gravemente enferma pudiera necesitar antibióticos. Una persona enferma debe evitar propagar la enfermedad al:

- Lavarse las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño.
- Utilizar guantes desechables para limpiar las heces, así como los artículos y superficies que han entrado en contacto con heces o con carne cruda de ave.
- Colocar los guantes, la ropa y los trapos sucios con la bacteria en una bolsa de plástico sellada y tirarla a la basura.