

Protege a su hijo/a: tos ferina (tos convulsa)

LO QUE MADRES Y PADRES DEBEN SABER



Los bebés no pueden recibir su primera vacuna hasta los 2 meses, de modo que **dependemos de la protección de la comunidad.**



La vacuna

DTaP y Tdap (componente contra la tos ferina)

- La DTP de células completas se introdujo en la década de 1940.
- La DTaP acelular se introdujo en la década de 1990. La vacuna se actualizó para reducir el riesgo de efectos secundarios (fiebre alta que ocasionaba convulsiones).

Cómo funciona:

- Contiene antígenos purificados para estimular la protección sin usar la bacteria completa.

Posología:

- 5 dosis desde los 2 meses hasta los 6 años
 - Se recomienda un refuerzo de Tdap entre los 11 y 12 años y durante el embarazo.



La vacuna DTaP es el motivo por el cual las **muerpes por tos convulsa en bebés cayeron drásticamente** en EE. UU.

¿Qué es la tos ferina (tos convulsa)?



Una infección respiratoria grave que causa **tos incontrolable**, dificultad para respirar y vómitos después de los ataques de tos. La tos puede durar semanas o meses.

La tos ferina puede causar **neumonía, convulsiones, daño cerebral** y la muerte, especialmente en bebés.

¿Quiénes son más vulnerables? Los lactantes menores de seis meses que aún no tienen el calendario completo de vacunas. La enfermedad de la tos convulsa presenta brotes cada 3 a 5 años.

¿Es segura la vacuna? Sí.

- La DTaP es **más segura que nunca**, con menos efectos secundarios que las primeras versiones.
- Los estudios a gran escala no demuestran **ningún vínculo con el autismo** o con problemas del desarrollo.
- Revisada de forma continua por paneles independientes de seguridad.

Apoyo y orientación

Hable con su pediatra, su médico de familia o su proveedor de atención obstétrica (si está embarazada) porque ellos conocen mejor la salud de su hijo/a y su calendario de vacunación.

Recursos confiables: [AAP HealthyChildren.org](http://AAP.HealthyChildren.org)

¿Alternativas?

- La tos ferina es **altamente contagiosa y muy peligrosa**, especialmente en los recién nacidos.
- Demorar la aplicación de las vacunas crea un riesgo innecesario.
- Las mujeres embarazadas deben aplicarse Tdap en **cada embarazo** para proteger a los recién nacidos.

Estamos juntos en esto. Proteja a su bebé con confianza, no con miedo. Estamos aquí para responder sus preguntas, apoyar sus decisiones y celebrar la protección que le brinda a su familia.