

ĐIỀU MỌI CHA MẸ CẦN BIẾT

i Trước khi có vắc-xin, bại liệt đã khiến hơn **15,000 trẻ em bị liệt mỗi năm** chỉ riêng tại Hoa Kỳ.



Vắc-xin

- IPV (vắc-xin tiêm): Được giới thiệu năm **1955**
- OPV (vắc-xin bại liệt uống): Dạng nhỏ giọt được giới thiệu năm 1961, không còn sử dụng tại Hoa Kỳ từ năm 2000.

Cơ chế hoạt động:

- IPV sử dụng **vi-rút đã chết (bất hoạt)** để giúp cơ thể học cách nhận diện và chống lại bệnh bại liệt mà không có nguy cơ gây bệnh.

Liều tiêm:

- **4 liều** vào các mốc 2, 4, 6-18 tháng tuổi và 4-6 tuổi
- Tác dụng phụ nhẹ: thỉnh thoảng bị đỏ hoặc đau tại chỗ tiêm.

i IPV (vắc-xin tiêm) là loại vắc-xin bại liệt duy nhất được sử dụng tại Hoa Kỳ hiện nay. IPV có hiệu quả bảo vệ tương đương OPV nhưng an toàn hơn vì chỉ gây tác dụng phụ nhẹ và không có nguy cơ gây bại liệt.

i Nhờ vắc-xin, bại liệt đã bị xóa sổ tại Hoa Kỳ, nhưng bệnh vẫn tồn tại ở một số quốc gia.

Bại liệt là gì?



Bại liệt là một **bệnh do vi-rút rất dễ lây**, lây truyền qua tiếp xúc với phân, nước bọt hoặc nước bị nhiễm mầm bệnh.

Bại liệt có thể gây **liệt**, tàn tật vĩnh viễn hoặc tử vong. Trong một số trường hợp, bệnh gây **yếu cơ suốt đời** hoặc các vấn đề về hô hấp.

Ai dễ bị tổn thương nhất? Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và bất kỳ ai chưa được chủng ngừa.

Vắc-xin Có An Toàn Không? Có.

- **Đã được sử dụng trong hơn 70 năm. Được cải tiến theo thời gian.**
 - Tại Hoa Kỳ, IPV (vắc-xin tiêm) đã thay thế OPV (vắc-xin uống) từ năm 2000 nhằm loại bỏ **nguy cơ hiểm gặp nhưng nghiêm trọng** của bại liệt do vắc-xin gây ra.
 - IPV là vắc-xin bất hoạt hoàn toàn, nghĩa là **không thể gây** bại liệt.
- **Được chứng minh an toàn** qua các nghiên cứu lớn.
 - Được thử nghiệm trong các **thử nghiệm lâm sàng mang tính bước ngoặt** do Bác sĩ Jonas Salk thực hiện trước khi đưa vào sử dụng.
 - Được đánh giá trong **hiệu chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế** trên hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới.
 - Được **Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP)** xác nhận về tính an toàn và hiệu quả.
- Được theo dõi an toàn liên tục bởi **VAERS** và **Vaccine Safety Datalink**.

Hỗ Trợ & Hướng Dẫn

Hãy trao đổi với bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ gia đình của quý vị. Họ là người hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe và lịch chủng ngừa của con quý vị.

Tài Nguyên Đáng Tin Cậy: AAP HealthyChildren.org

Có Giải Pháp Thay Thế Không?

- Không có **giải pháp thay thế an toàn** nào cho việc chủng ngừa. "Miễn dịch tự nhiên" chỉ có sau khi nhiễm bệnh, điều này có thể gây tổn thương vĩnh viễn.
- Việc trì hoãn chủng ngừa làm tăng nguy cơ cho con quý vị trong những năm đầu đời dễ bị tổn thương.
- Vắc-xin phối hợp có thể giúp giảm thiểu số mũi tiêm.
- Thay đổi lịch chủng ngừa không được các tổ chức y tế lớn khuyến nghị và làm gián đoạn sự bảo vệ.

i Việc chọn không chủng ngừa gây nguy hiểm cho sức khỏe của con quý vị và những người xung quanh.

Việc đặt câu hỏi cho thấy quý vị đang quan tâm. Hãy cùng nhau tiếp tục nỗ lực để giữ cho con quý vị luôn khỏe mạnh, an toàn và vững vàng.